



Varningstecken

för Inborn Errors of Immunity (IEI) hos barn

Stämmer ett eller flera av följande varningstecken in och andra vanliga orsaker uteslutits, bör utredning övervägas:

1. ≥ 1 invasiv infektion såsom osteomyelit, meningit eller sepsis
2. Upprepade antibiotikakrävande otiter ($\geq 4/\text{år}$), sinuiter ($\geq 2/\text{år}$) eller pneumonier ($\geq 2/\text{år}$)
3. Återkommande hud- och mjukdelsinfektioner, organabscesser eller icke-infektiösa granulom
4. Infektioner som inte läker på förväntat sätt med adekvat antibiotikabehandling eller med ovanlig lokalisation eller orsakade av ovanliga agens
5. Uttalad kronisk oral eller kutan candidos
6. Multipla autoimmuna sjukdomar eller mycket tidig debut av autoimmun sjukdom ($\leq 3\text{år}$)
7. Autoinflammatoriska sjukdomar, dvs återkommande episoder av generaliserad inflammation, där ingen infektiös, malign eller autoimmun orsak kan identifieras
8. Omfattande hudförändringar, erythrodermi eller eksem som inte svarar på behandling
9. Spädbarn som inte växer som förväntat
10. Känd IEI i familjen